

MUCOVAGIN®
żel

MUCOVAGIN®
żel

Regeneracja błony śluzowej pochwy

Żel dopochwowy z kwasem
hialuronowym

Wyłączny Dystrybutor:

VERCO S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa

www.mucovagin.pl



HELP SA
10 Valaoritou St., 144 52 Metamorphosis, Attica, Grecja
tel.: +30 210 281 5353, Fax: +30 210 281 1850
Zakład: Pedini Ioanninon, 455 00 Ioannina, Grecja

verco
WELLNESS IS OUR CHALLENGE

MUC25/I/011221

CE 0653

MUCOVAGIN® żel

Regeneracja błony śluzowej pochwy
Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym

Wspomaga nawilżenie i odbudowę błony śluzowej pochwy

Mechanizm działania:

Kwas hialuronowy, główny składnik tego produktu, jest naturalnym składnikiem budulcowym ludzkiego organizmu. Kwas hialuronowy wiąże wodę, dzięki czemu tworzy wiskoelastyczną warstwę ochronną na powierzchni błony śluzowej pochwy. Tworzy on zatem powłokę ochronną na błonie śluzowej i wspomaga przywrócenie naturalnego nawilżenia. W ten sposób może mieć on duży wpływ na elastyczność tkanek i wspomagać naturalny proces gojenia.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania kwasu hialuronowego w żelu jest łagodzenie suchości pochwy:

- u kobiet po menopauzie z rozpoznaniem zaniku błony śluzowej pochwy i objawami podrażnienia, swędzenia i bólu podczas współżycia płciowego (dyspareunia),
- u kobiet przed menopauzą po niedawno przebytej operacji w obrębie narządów płciowych, mających predyspozycję do dyspareunii,
- u kobiet z dystrofią błony śluzowej spowodowaną promieniowaniem jonizującym, krioablacją, chemioterapią, glikokortykosteroidami, doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi lub jakąkolwiek inną interwencją medyczną.

Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym stosuje się jako produkt wspomagający pielęgnację ran po porodzie, ułatwiający gojenie po operacjach ginekologicznych pochwy, w przypadku suchości pochwy związanej z wiekiem lub niedoborem estrogenów związanym z menopauzą.

Produkt wskazany jest także w stanach atrofii i dystrofii błony śluzowej, a zwłaszcza zalecany jest jako terapia wspomagająca w stanach dystrofii spowodowanych przewlekłym podawaniem glikokortykosteroidów, jako produkt umożliwiający lepszą pielęgnację ran oraz jako produkt ułatwiający współżycie płciowe.

Zalecane stosowanie wyrobu – Czas stosowania:

Żel z kwasem hialuronowym przeznaczony jest do miejscowego stosowania dopochwowego i/lub na zewnętrzne narządy płciowe, w stanach, w których jest to konieczne. Czasu stosowania nie można

łatwo ustalić. U pacjentek leczonych napromienianiem żel zaleca się stosować równoległe z radioterapią, zwykle przez niedługi okres. U kobiet przed menopauzą po niedawno przebytej operacji ginekologicznej żel zaleca się stosować przez pewien okres, w zależności od postępów gojenia.

Kobiety po menopauzie z atrofią i suchością pochwy z powodu niskich stężeń estrogenów endogennych mogą stosować żel systematycznie, choć nawet w tych przypadkach produkt może być stosowany z przerwami, w zależności od aktywności seksualnej. W każdym przypadku kwas hialuronowy jest fizjologicznym składnikiem organizmu człowieka, który nie budzi żadnych poważnych obaw co do działań toksycznych.

Zaleca się aplikowanie produktu co trzy dni wieczorem przed snem przez okres 30 dni bądź według zaleceń lekarza.

Dawkowanie:



Typowe dawkowanie to jeden aplikator żelu na noc. Żel przy pomocy aplikatora wprowadzamy głęboko do pochwy bądź na zewnętrzne okolice intymne przy czym należy stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania:

Żel dopochwowy Mucovagin należy stosować wyłącznie miejscowo – wewnątrz pochwy i/lub na okolice zewnętrznych narządów płciowych. Przed użyciem produktu i u jego użyciu należy umyć ręce.

Sposób użycia – aplikacja dopochwowa:

- Przed użyciem produktu najpierw należy zdjąć nakrętkę.
- Nakręcić aplikator na tubkę (patrz rysunek).
- Delikatnie napelnić aplikator wymaganą ilością żelu (ustawioną na 2,5 ml). Odczekać aplikator od tubki. Po każdym użyciu zamknąć tubkę zakrętką.
- Przed użyciem nie pozostawiać żelu w aplikatorze na okres dłuższy niż 30 minut. Oznacza to, że żel w aplikatorze nieużyty w ciągu 30 minut należy po tym czasie wyrzucić razem z aplikatorem.
- Należy się położyć, delikatnie wsunąć aplikator głęboko do pochwy i wcisnąć tłoczek do oporu (patrz rysunek).
- Wyciąć obie części aplikatora z pochwy.
- Aby uzyskać odpowiedni poziom nawilżenia po zaaplikowaniu produktu, należy go delikatnie docisnąć.
- W razie potrzeby można usunąć nadmiar żelu z okolic zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu chusteczki.



9. Po użyciu należy wyrzucić aplikator.

Sposób użycia – aplikacja na zewnętrzne narządy płciowe:

Należy użyć niewielką ilość produktu (równą zawartości aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów płciowych.

Przeciwwskazania:

Rozpoznane uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Działania niepożądane:

Nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych.

⚠ Ostrzeżenia:

- Produkt wyłącznie do stosowania miejscowego: wewnątrz dopochwowo lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych.
- Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Wyrzucić puste opakowanie bez zaśmiecania środowiska.
- Zamknąć tubkę z powrotem natychmiast po użyciu żelu.
- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Produkt może być stosowany podczas miesiączki.
- Nie stosować jednocześnie z preparatami do dezynfekcji zawierającymi czwartorzędowe sole amoniowe, takie jak chlorek benzalkonium, ponieważ kwas hialuronowy może się wytrącić w ich obecności.
- Nie należy ponownie używać aplikatora.
- Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią mogą stosować żel zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
- Zawsze sięgaj po poradę u lekarza lub farmaceuty.
- Zawsze należy stosować produkt zgodnie z instrukcją użycia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przeprowadzone testy wykazały, że żel Mucovagin nie wpływa negatywnie na prezerwatywy lateksowe i nielateksowe.**
- Przeznaczenie żelu Mucovagin to wspomaganie nawilżenia i odbudowy błony śluzowej pochwy dzięki czemu ułatwia kontakty intymne. Mucovagin posiada właściwości poślizgowe, ale nie jest lubrykantem.**

Co należy wiedzieć o dacie ważności produktu?

- Data ważności jest wydrukowana na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym.**
- Po upływie tej daty produktu nie należy stosować.**

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.
- Zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia.

Skład:

Jeden aplikator (2,5 ml) zawiera kwas hialuronowy 5 mg (w postaci soli sodowej), glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloaminę, wodę oczyszczoną. MUCOVAGIN nie zawiera hormonów, parabenów, olejków, wyjątkowo roślinnych ani substancji zapachowych.

Opakowanie:

- Pudełko kartonowe zawierające tubkę z 25 g produktu z 7 aplikatorami jednorazowego użytku.
- Pudełko kartonowe zawierające tubkę z 4 g produktu z 1 aplikatorem jednorazowego użytku.
- Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Data ostatniej wersji instrukcji używania:

19.10.2021 r.



10 Valaoritou St., 144 52 Metamorphosis, Attica, Grecja
tel.: +30 210 281 5353, Fax: +30 210 281 1850

Zakład: Pedini Ioanninon, 455 00 Ioannina, Grecja
info@help.com.gr
www.help.com.gr

Wylączny Dystrybutor:

VERCO S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa
www.mucovagin.pl
Wyprodukowano w Grecji zgodnie z przepisami UE dotyczącymi GMP.



Objaśnienie użytych symboli:

- Ostrzeżenia
- Zajrzyj do instrukcji używania
- Użyć do daty
- Kod partii
- Wytwórca
- Nie używać ponownie aplikatora
- Najwyższa dopuszczalna temperatura 25°C